

Písemná část přijímací zkoušky z chemie

pro šk. rok 2024/25

bakalářský studijní program: Biotechnologie a genové inženýrství, varianta A

(a) názvosloví a výpočty

Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; **nepovoleny** jsou tabulky a učebnice). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Maximální počet: 40 bodů.

1. Napište názvy anorganických sloučenin: (1 bod/název)

Fe₃(PO₄)₂

CaH₂

ZnSO₄·7 H₂O

K₃[Fe(CN)₆]

2. Napište vzorce anorganických sloučenin: (1 bod/vzorec)





dihydrogenfosforečnan železitý

oxid hlinitý

dekahydřát uhličitanu sodného

hexanitrokobaltitan sodný

3. Napište názvy organických sloučenin: (1 bod/název)




4. Napište vzorce organických sloučenin: (1 bod/vzorec)

D-fruktosa	thiofen
močovina	1,2-dichloro-4,4-dimethylpentan

5. Zapište elektronovou konfiguraci iontu, určete počet jeho protonů, neutronů a elektronů. (2 body)



6. Upravte rovnice reakcí. U redoxních reakcí uveďte poloreakce a počty vyměněných elektronů. (2 body/rovnice)



7. Vypočítejte, kolik molekul a atomů je obsaženo v 7 dm^3 kyslíku. $\text{Ar(O)} = 16$. (2 body)

8. Vypočítejte navážku $\text{Mg(ClO}_4\text{)}_2$ potřebného k přípravě 500 cm^3 roztoku o koncentraci $0,3 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ $\text{Ar(O)} = 16$, $\text{Ar(Mg)} = 24,31$, $\text{Ar(Cl)} = 35,45$. (2 body)

9. Vypočítejte hmotnost jodidu draselného potřebného k přípravě 700 ml roztoku o hmotnostním obsahu 30 % KI, jehož hustota je $1,216 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. $\text{Ar(K)} = 39,1$, $\text{Ar(I)} = 126,9$. (2 body)

10. Koncentrace roztoku kyseliny sírové je $2 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ a hustota $1,1206 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. Vyjádřete složení roztoku hmotnostními procenty. $\text{Ar(H)} = 1$, $\text{Ar(O)} = 16$, $\text{Ar(S)} = 32,06$. (2 body)

11. Jaký objem vody a jaký objem 80% (v/v) ethanolu potřebujeme na přípravu 20% (v/v) roztoku ethanolu s objemem 500 ml? (2 body)

12. Jaké pH má roztok, který obsahuje 0,5 g NaOH v 2 dm³? Ar(H) = 1, Ar(O) = 16, Ar(Na) = 22,99. (2 body)

13. Smícháním 150 g roztoku o hmotnostním obsahu 5 % AgNO₃, 50 g dusičnanu stříbrného a vody má být připraven roztok o hmotnostním složení 25 % AgNO₃. Vypočítejte hmotnost výsledného roztoku a objem přidané vody. Ar(Ag) = 107,87, Ar(N) = 14, Ar(O) = 16. (3 body)

14. Jaké bude pH výsledného roztoku, zředíme-li 25 cm³ 0,1 M roztoku HCl destilovanou vodou na objem 400 cm³? Ar(H) = 1, Ar(Cl) = 35,45. (3 body)

(b) test

- Čas: 15 minut (žádné pomůcky **NEJSOU** povoleny). Zakroužkujte správnou odpověď. Z nabídnutých možností je jen jedna odpověď správná. Maximální počet: 20 bodů.

1. Nukleonové číslo vyjadřuje:

- počet neutronů v jádře; označuje se také jako nukleonové;
- počet nukleonů a elektronů v atomu; označuje se také jako hmotnostní;
- počet protonů v jádře; označuje se také jako protonové;
- celkový počet nukleonů v jádře; označuje se také jako hmotnostní.

2. Eliminace je chemická reakce, při které:

- vzniká násobná vazba mezi dvěma atomy C;
- se na dva sousední atomy C naváží atomy nebo skupiny atomů;
- dochází k otevření cyklické molekuly;
- zaniká násobná vazba mezi dvěma atomy C.

3. Který ze sacharidů poskytne při reakci s Lugolovým roztokem tmavě modré zbarvení

- fruktosa;
- maltosa;
- glukosa;
- škrob.

4. Která z dusíkatých bází není obsažena v molekule DNA?

- adenin;
- guanin;
- uracil;
- thymin.

5. Mezi pyrimidinové báze nepatří:

- cytosin;
- adenin;
- thymin;
- uracil.

6. Konečným produktem glykolýzy ve svalech je:

- a. oxid uhličitý;
- b. glyceraldehyd-3-fosfát;
- c. ethanol;
- d. laktát.

7. Vyberte nesprávné tvrzení:

- a. Mastné kyseliny jsou v organismu zdrojem energie.
- b. Nasycené mastné kyseliny jsou pro lidský organismus esenciální.
- c. Neesenciální mastné kyseliny lidský organismus umí syntetizovat.
- d. Vyšší nenasycené mastné kyseliny musí být do lidského organismu dodávány v potravě.

8. Vyberte správné tvrzení:

- a. Transferová RNA nesoucí aminokyseliny se páruje s DNA, jejíž sekvence určuje sled aminokyselin v polypeptidovém řetězci.
- b. Pořadí aminokyselin v řetězci nemá vliv na sekundární strukturu proteinů.
- c. Podle komplementarity bazí se spolu párují vždy dvě purinové nebo dvě pyrimidinové báze.
- d. Při syntéze proteinů je nejprve DNA přepsána na mRNA a ta poté slouží jako templát pro syntézu polypeptidového řetězce.

9. Elektrofil je:

- a. částice s nedostatkem elektronů, např. NO_2^+ ;
- b. částice vyhledávající záporný náboj, např. $\text{R}-\text{NH}_2$;
- c. částice s nedostatkem elektronů, např. H_2O ;
- d. částice vyhledávající záporný náboj, např. NH_3 .

10. Enzymy:

- a. snižují aktivační energii katalyzované reakce;
- b. vždy obsahují pouze bílkovinnou složku;
- c. nejsou ovlivněny prostředím – pH, teplotou a přítomností dalších látek;
- d. mění rovnovážnou konstantu dané reakce.